

Timbro della struttura che rilascia la scheda informativa



CICLOPLEGIA E MIDRIASI

L'esame in cicloplegia va sempre concordato con i genitori segnalandone la necessità: insieme ai limiti della visita oculistica senza instillazione dello stesso, è necessario riportare in cartella/scheda/memoria rilasciata all'assistito eventuali effetti avversi già avvenuti in relazione alla stessa procedura e indicare, ove nota, la molecola impiegata.

Quando si effettua l'esame è doveroso altresì indicare in cartella/scheda/memoria che l'esame è stato eseguito in **cicloplegia**, ma non appare necessario, per procedere, richiedere consenso informato scritto e controfirmato, perché la manovra è considerata buona pratica.

L'inserimento della dicitura "cicloplegia", nella cartella/scheda/memoria redatta, fa fede sulla condivisione con i genitori, o esercenti la potestà familiare, della scelta di usare questo presidio diagnostico.

PER LA CICLOPLEGIA

tropicamide (azione circa 4 ore, **da instillare almeno due volte**, effetto massimo dopo 30'); ciclo-pentolato (azione fino 8 ore, **da instillare non più di due volte** a distanza di 5', effetto massimo dopo 20').

L'impiego di Atropina in considerazione dell'azione prolungata, della necessità di instillazioni per più giorni e dei frequenti episodi di intolleranza non è oggi considerato presidio di prima scelta ma può essere riservato a situazioni particolari.

PER LA DILATAZIONE in ambulatorio,

in particolar modo nella valutazione della ROP, mix di 1 ml del prodotto commerciale disponibile di tropicamide-fenilefrina diluito in 3 ml di tropicamide 1% **da instillare tre-quattro volte** a distanza di 10'. Per i riferiti episodi di tachicardia e ipertensione rilevati dopo somministrazione di tropicamide-fenilefrina si raccomanda di ostacolarne il passaggio attraverso i puntini lacrimali e il possibile assorbimento attraverso la mucosa nasale.

Per somministrazione di farmaco, una sola goccia se correttamente instillata è in genere sufficiente; nei bambini molto pigmentati può essere necessaria una somministrazione supplementare.